

Lebensmittelinformation – Sanostol Lutschtabletten

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Calcium. Mit Süßungsmitteln.

| Nährstoffe | pro 2 (3) Tabletten | % der Referenzmenge* 2(3) Tabletten |
|-------------------------|------------------------|---|
| Vitamin A | 533 (800) µg RE | 67 (100) % |
| Vitamin D | 3,3 (5,0) µg | 67 (100) % |
| Vitamin E | 6,7 (10) mg α-TE | 56 (83) % |
| Vitamin B ₁ | 0,67 (1,0) mg | 61 (91) % |
| Vitamin B ₂ | 0,73 (1,1) mg | 52 (79) % |
| Vitamin B ₆ | 0,46 (0,70) mg | 33 (50) % |
| Vitamin B ₁₂ | 1,2 (1,8) µg | 48 (72) % |
| Niacin | 8,0 (12) mg NE | 50 (75) % |
| Pantothensäure | 3,3 (5,0) mg | 56 (83) % |
| Vitamin C | 53 (80) mg | 67 (100) % |
| Folsäure | 200 (300) µg | 100 (150) % |
| Biotin | 13 (20) µg | 27 (40) % |
| Calcium | 200 (300) mg | 25 (38) % |

* gemäß Lebensmittelinformationsverordnung

Verzehrempfehlung: Kinder von 4 bis 7 Jahren lutschen 2 Tabletten täglich, Kinder ab 7 Jahre, Jugendliche und Erwachsene 3 Tabletten.

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B₁, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Vitamin B₁₂, Vitamin D, Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Folsäure, Biotin, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aromen, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K).

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Das Produkt enthält Vitamin A. Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, sollten vor dem Beginn des Verzehrs ihren Arzt befragen.

Vor Wärme, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Enthält eine Phenylalaninquelle.

75 Stück / 90 g

DR. KADE
Pharmazeutische Fabrik GmbH, Rigistraße 2, 12277 Berlin