

Salus

Heidelbeeren

Arzneitee, Myrtilli fructus

freiverkäufliches Arzneimittel

- Pflanzliches Arzneimittel bei Durchfall und bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum

Artikel	Menge	Grundpreis	Preis (UVP)
---------	-------	------------	-------------

Heidelbeeren	1 Btl à 100 g	102,90 € / 1 kg	10,29 €
--------------	---------------	-----------------	---------

Art. Nr.: 01001637 | PZN: 03424930

Anwendungen, Dosierung, Verzehrempfehlung

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, bei Durchfallerkrankungen 2–6-mal täglich eine Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses trinken:

1 Esslöffel voll (ca. 10 g) kurz vor Gebrauch zerquetschter Heidelbeeren mit ca. 150 ml Wasser übergießen, etwa 10–15 Min. zum Sieden erhitzen und anschließend noch heiß abseihen.

Zum Spülen und Gurgeln einen Aufguss in der angegebenen Menge oder dem benötigten Vielfachen wie folgt herstellen:

10 g Heidelbeeren mit 100 ml Wasser übergießen, für etwa 10–15 Min. zum Sieden erhitzen und anschließend noch heiß abseihen.

Art der Anwendung:

Zum Trinken sowie zum Spülen und Gurgeln nach Bereitung eines Teeaufgusses

Zusammensetzung lt. Packungsangabe

Zusammensetzung und Inhalt der Packung

100 g Arzneitee enthalten 100 g Heidelbeeren.

Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

DE-ÖKO-003

PFLICHTANGABEN

Heidelbeeren

Anwendungsgebiete: Unspezifische, akute Durchfallerkrankungen; leichte Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum. Hinweise: Bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhung einhergehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern grundsätzlich die Rücksprache mit einem Arzt. Sollten die Beschwerden bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum länger als 1 Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsangaben und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.