

Salus

Kamillenblüten

Arzneitee, Matricariae flos

freiverkäufliches Arzneimittel

- Pflanzliches Magen-Darm-Mittel
- Mittel bei örtlichen Entzündungen

Artikel	Menge	Grundpreis	Preis (UVP)
Kamillenblüten	1 Btl à 50 g	93,80 € / 1 kg	4,69 €

Art. Nr.: 01001624 | PZN: 05351738

Anwendungen, Dosierung, Verzehrempfehlung

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, bei Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich 3–4-mal täglich eine Tasse des wie folgt frisch bereiteten Teeaufgusses zwischen den Mahlzeiten trinken:

1 gehäufte Eschöpfel (ca. 3 g) Kamillenblüten mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen, zudecken und nach etwa 5–10 Min. absehen. Zum Gurgeln, Spülen, Inhalieren und zur Bereitung von Umschlägen einen Aufguss in der angegebenen Menge oder dem benötigten Vielfachen wie folgt herstellen: 3–10 g Kamillenblüten mit 100 ml sprudelnd kochendem Wasser übergießen, zudecken und nach etwa 5–10 Min. absehen.

Als Badezusatz werden 50 g Kamillenblüten auf 10 l Wasser eingesetzt.

Art der Anwendung:

Zum Trinken, Gurgeln, Spülen, Inhalieren und für Umschläge nach Bereitung eines Teeaufgusses;
Zur Bereitung von Bädern

Dauer der Anwendung:

Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

Zusammensetzung lt. Packungsangabe

Zusammensetzung und Inhalt der Packung

Kamillenblüten

Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

DE-ÖKO-003

PFLICHTANGABEN

Kamillenblüten

Anwendungsgebiete: Innerliche Anwendung bei: Krämpfen und entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich. Äußerliche Anwendung bei: Haut- und Schleimhautentzündungen sowie bakteriellen Hauterkrankungen einschließlich der Mundhöhle und des Zahnfleisches; entzündlichen Erkrankungen und Reizzuständen der Luftwege (Inhalationen); Erkrankungen im Anal- und Genitalbereich (Bäder, Spülungen). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsangaben und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.