

Gebrauchsinformation

Ginseng- logoplex® Tropfen

Mischung flüssiger Verdünnungen

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,
Ziegen, Hunde, Katzen

Zusammensetzung:

Wirkstoffe pro 100g:

Panax ginseng Dil. D2 1,0g, Aconitum napellus Dil. D3 1,0g, Anamirta cocculus Dil. D3 1,0g, Atropa bella-donna Dil. D3 1,0g, Bryonia Dil. D2 1,0g, Cinchona pubescens Dil. D2 1,0g, Conium maculatum Dil. D3 1,0g, Gelsemium sempervirens Dil. D3 1,0g, Hypericum perforatum Dil. D2 1,0g, Lycopodium clavatum Dil. D2 1,0g, Pulsatilla pratensis Dil. D2 1,0g, Rhus toxicodendron Dil. D3 1,0g, Solanum dulcamara Dil. D3 1,0g, Strychnos nux-vomica Dil. D3 1,0g, Symphytum officinale Dil. D2 1,0g.

Sonstige Bestandteile:

Ethanol, gereinigtes Wasser. Hinweis: Arzneimittel enthält 43 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Inhalt:

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Eingeben.

Pharmazeutischer Unternehmer:

FRANZ ZIEGLER GmbH, Ötzer Str. 10,
86672 Thierhaupten, Telefon: 08271-813111,
Telefax: 08271-813112

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **Ginseng-logoplex® Tropfen** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **Ginseng-logoplex® Tropfen** bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Zum Eingeben. Vor Entnahme Arzneimittel gut durchschütteln. Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind 3 x 60 Tropfen
Kalb, Schwein 3 x 40–60 Tropfen
Großer Hund 3 x 40 Tropfen
Mittlerer Hund, Schaf, Ziege 3 x 30 Tropfen
Kleiner Hund, Katze 3 x 20 Tropfen

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf liegt die Behandlungsdauer zwischen 5-7 Tagen. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege
Essbare Gewebe 0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege
Milch 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nicht über 25°C lagern. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:

November 2009 – Apothekenpflichtig

Hinweise für Anwender:

ZIEGLER Kombinationsarzneimittel bestehen aus natürlichen Vorkommen des pflanzlichen, tierischen und mineralischen Bereichs. In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels u.a. beschrieben bei: Erschöpfungszuständen, in der Rekonvaleszenz.

Handelsform:

Originalpackung mit 5 Flaschen á 100 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Eingeben.

11-0055-1109